


Ameriški škržatek prenašalec zlate trsne rumenice

Zlato trsno rumenico prenaša žuželka ameriški škržatek, ki je v Sloveniji navzoč povsod, kjer so vinogradi. Za preprečevanje širjenja te nevarne karantenske bolezni je poleg odstranjevanja okuženih trt nujno redno zatiranje ameriškega škržatka v skladu z napovedjo javne službe za varstvo rastlin in je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenih območjih zlate trsne rumenice ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.



velikost 4,8 - 5,5 mm

Napovedi za zatiranje so objavljene na spletni strani <http://www.fito-info.si/pr/obv/>



Razmejena območja zlate trsne rumenice v novembru 2012

Ukrepe na razmejenih območjih določa pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 73/2009)

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti, pokličite na eno izmed ustanov javne službe za varstvo rastlin ali fitosanitarnega inšpektorja ali na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Več informacij je na spletni strani <http://www.uvhvvr.gov.si/si/>

Območni uradi Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Upravi za RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

OU Ljubljana: 01 234 45 50, OU Kranj: 04 231 93 00, OU Nova Gorica: 05 330 22 70, OU Koper: 05 663 45 00, OU Novo mesto: 07 393 42 25, OU Maribor: 02 238 00 00, OU Murska Sobota: 02 521 43 40, OU Ptuj: 02 798 03 60, OU Celje: 03 425 27 70, OU Postojna: 05 721 15 50

SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN	
Območje napovedi	Ustanova
Osrednja Slovenija in Splošne napovedi za vso Slovenijo	Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana Tel. (01) 28 05 262 Fax. (01) 28 05 255 Tel. odzivnik: (01) 28 05 266 e-pošta: info@kis.si spletna stran: http://www.kis.si
Severovzhodna Slovenija	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel. (02) 228 49 00 Fax. (02) 251 94 82 Tel. odzivnik: 090 93 98 12 e-pošta: info@kmetijski-zavod.si spletna stran: http://www.kmetijski-zavod.si/
Celjska in Koroška regija	Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec Tel. (03) 712 16 00 Fax. (03) 712 16 20 Tel. odzivnik: (03) 712 16 60 e-pošta: tajnistvo@ihps.si spletna stran: http://www.ihps.si
Zahodna Slovenija	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Pri Hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica Tel. (05) 33 51 200 Fax. (05) 33 51 260 Tel. odzivnik: 090 93 98 15 e-pošta: entolab@go.kgzs.si spletna stran: http://www.kmetijskizavod-ng.si/
Jugovzhodna Slovenija	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Šmihelska cesta 14, SI-8000 Novo mesto Tel. (07) 373 05 70 Fax. (07) 373 05 90 Tel. odzivnik: 090 93 98 17 e-pošta: kss.oddelek-nm@gov.si spletna stran: http://www.kmetijskizavod-nm.si/

Tekst in fotografije: E. Orešek, A. Benko Beloglavec, G. Seljak; Tisk: Birografika BORI, Izdaja: UVHVR, ki jo zastopa generalna direktorica dr. Vida Čadonič Spelič; Ljubljana, 20113

Tel: +386 (01) 300 13 00 Fax: +386 (01) 300 13 56 E-pošta: fito.uvhvvr@gov.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARTVO RASTLIN

ZLATA TRSNA RUMENICA nevarnost za slovenske vinograde



Zlata trsna rumenica je karantenska bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma *Grapevine flavescence dorée* (FD). Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo ameriškega škržatka, ki prenaša fitoplazmo z okuženih na zdrave trte. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja zlate trsne rumenice se na okuženih trtah pričnejo pojavljati takoj po cvetenju in se proti jeseni stopnjujejo. Po navadi zajamejo cel trs, včasih pa le posamezne rozge. Dobro so vidna na vinski trti, tudi na samorodnih trtah, na matičnih rastlinah za podlage pa le redko ali pa so slabše izražena.



Pri rdečih sortah se pojavi rdečenje listja, pri belih sortah pa rumenenje listja, ki zajame vse liste na poganjku. Značilno je vihanje listnih robov. Intenzivnost vihanja je odvisna od sorte in razvitosti bolezenskih znamenj (v začetku poletja manj, proti jeseni pa vedno bolj). Listi postanejo krhki in se pri mečkanju zdrobijo.



Značilno je splošno ali sektorsko rdečenje ali rumenenje listov. Obolelo tkivo lahko pozneje na posameznih delih odmre. Po odpadanju listja pecelj še dolgo ostane na rozgi.



Zanesljiv znak okužbe so mlahavi in povešeni poganjki, ki ne olesenijo, zato pozimi pogosto pozebejo. Na notranji strani luba se lahko razvijejo nekroze. Okužene trte spomladi pozneje in neenakomerno odganjajo.

Oplodnja pri okuženih trtah je slabša, značilno je osipanje in včasih odmiranje kabrnkov. Od sredine poletja dalje se sušijo celi grozdi ali njihovi deli.



Odstranitev okuženih trt

V žariščih okužbe zlate trsne rumenice je obvezna odstranitev okuženih trt s koreninami vred. Če korenine niso povsem odstranjene, lahko iz njih ponovno odženejo okuženi poganjki, ki so vir okužbe. V takem primeru poganjke uničimo s premazovanjem s herbicidom na podlagi glifosata.

Zamenjave

Zlate trsne rumenice ne smemo zamenjati z virusnim zvijanjem listja vinske trte, za katerega je značilno rumenenje (bele sorte) ali rdečenje listja (rdeče sorte) med listnimi žilami, robovi listnih ploskev pa se zvijajo navzdol. Ta znamenja so bolj izrazita na starejših listih v spodnjem delu trsa. Za pomanjkanje magnezija je značilno rumenenje listja med listnimi žilami pri belih sortah in rdečenje pri rdečih sortah, ki se pojavi najprej na spodnjih listih.



Ostale gostiteljske rastline

Poleg trte je lahko okužen tudi navadni srobot, ki predstavlja vir okužb, zato ga je iz vinogradov in njihove okolice priporočljivo odstraniti. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah ter njihovi okolici je odstranitev navadnega srobotu obvezna. FD je bila ugotovljena tudi v jelši.

